







1ª ESCUELA DE VERANO CEMAT EN HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS: estudio, aplicaciones y enseñanza

A CORUÑA, del 8-10 octubre 2025 Fundación Luis Seoane-UIMP



NyL



Luis Español González luis.espanol@unirioja.es



Dos caminos para el cálculo infinitesimal: el insular de Newton y el continental de Leibniz

Dos anastomosis en el siglo XVII Geometría analítica y Cálculo infinitesimal

¿Cuál es la esencia de la investigación matemática? ¿Cómo se amplía sin cesar el patrimonio de esta ciencia? No incurriremos en la pretensión de contestar a estas preguntas, pero permítasenos señalar siquiera cuatro caminos cardinales que podemos designar así: anastomosis, correlación, generalización, especialización. [...]

Los progresos esenciales de la ciencia corresponden a la feliz cópula de dos conceptos que parecían lejanos e independientes, y al librarlos de su envoltura formal descubren tal identidad de substancia, que se anastomasan y hasta se funden en uno solo. La Geometría analítica de Cartesio, origen de la Matemática moderna, realizó brillantemente esta anastomosis del Álgebra con la Geometría. [25, p. 97] Julio Rey Pastor: «La investigación científica», Supl. Rev. Mat. Hispano-Americana 1, 1919.

El Cálculo infinitesimal anastomosa


Cálculo de tangentes / Cálculo de áreas

Cálculo diferencial / Cálculo integral

ARQUÍMEDES y lo infinitesimal

SEGUIDORES EN EL SIGLO XVII: EXPERIMENTADORES


III INVENTORES




ARQUÍMEDES y lo infinitesimal

El cálculo infinitesimal es la evolución de la obra de Arquímedes aplazada al siglo XVII


Sobre la esfera y el cilindro l y ll



Medida del círculo



Cuadratura de la parábola



Arquímedes. Obra escogida. ICM Madrid 2006

RSME / Patrimonio Nacional A. J. Durán (ed.) LaTeX de J. L. Varona


Cuadratura de la parábola

ARQUÍMEDES ICM Madrid 2006 Cuadratura de la Parábola

REMON -TOMAS , mai xwoia - TRONTI , E ENS OTHORE om cironerampanianipi poyu: Baloty & Sorti - row awron or w qualari, xai vifos yo auto soi urraula ra xupia a xarona ros - Hanaros · a'so yap minua To ad BEY TEPI exoluspor vijora subgat nai op toxunis nulvor 20mas · xupiade isa o rocació ignomunion ra Su Di . TE TO a Mastor de ésa To ingrapar יסט בידו ב ידי של בל בל בל אל אין . עם ולבש דם די עם בל בים דים By Look Low Lei Low Low Low of Long. Low on menn Ta Tualuati , real to tos Foor . Naper ofi To This per Tor Sust Xupiur, reglar 251, 250 Tou res - Printares xopicha to F. Twide maping -To me now Tun peatoris Ta de, a mojoin To afy Tripupor o'mramas/or is inarifa Tur afor BEY TOBLOWY. of hor ow us afect olepur autor Por isi Til grapia - navi ing To a By relyanor

es posible inscribir un polígono, de manera que los segmentos restantes 128 sean inferiores a toda área dada. Pues, sustrayendo siempre un área que, de acuerdo con esta proposición,* 'Proposición 20 es mayor que la mitad, es evidente que, disminuyendo siempre los segmentos restantes, anterior.

C I en un segmento comprendido por una recta y una parábola se inscribe un triángulo O con la misma base que el segmento y la misma altura, y se inscriben también en los demás segmentos otros triángulos que tengan la misma base que los segmentos y la [208 v.] misma altura, el triángulo inscrito en todo el segmento será óctuple de cada uno de los dos triángulos inscritos en los segmentos restantes.



los haremos inferiores a toda área dada. 129

N. de A.D.: Sobre lo dibujado por el copista del X-I-14 -véase el recto del folio 209-, se ha añadido al diagrama el segmento EB -tampoco está en el códice E ni en otros de la familia A-, pero aparece implícito en el texto de la proposición al considerar los triángulos AEB y ΘBE -Heiberg también lo incluve.

121

Sea el segmento AB Γ tal y como se ha dicho y divídase A Γ por la mitad en Δ ; trácese B Δ paralela al diámetro. Entonces el punto B es el vértice del segmento. Luego el triángulo Proposición 18. ABT tiene la misma base que el segmento y la misma altura. De nuevo divídase por la mitad AΔ por E y trácese EZ paralela al diámetro y divídase AB por Θ. Entonces el punto Z es vértice del segmento AZB. 130 Por tanto, el triángulo AZB tiene la misma base que el segmento AZB y la misma altura. Se ha de demostrar que el triángulo ABΓ es igual al óctuple del triángulo AZB.

Así pues, BΔ es cuatro tercios de EZ‡ y doble de EΘ.§ Entonces EΘ es igual al doble ‡Proposición 19. de ΘZ.¹³¹ De manera que el triángulo AEB es igual al doble de ZBA, pues el triángulo §Elementos VI.2. $AE\Theta$ es igual al doble de $A\Theta Z$ y ΘBE , igual al doble de $Z\Theta B$. ¹³² De manera que $AB\Gamma$ es igual al óctuple de AZB. 133 Y del mismo modo se demostrará también que es óctuple del triángulo inscrito en el segmento ΒΗΓ.


C I hay un segmento comprendido por una recta y una parábola, se ponen cuantas [209 r.] D áreas se quiera en una serie de razón cuatro¹³⁴ y es la mayor de las áreas igual al

- 128 N. de S.M.: «Restantes» (περιλειπόμενα) se lee en B y en G. En cambio, aquí (EH) se lee περιεπόμενα, que no da buen sentido
- 129 Principio de Eudoxo (Elementos X.1). Véanse las notas 33 y 68 de EC. I sobre la aplicación de esta importante proposición.
- ¹³⁰Por semejanza de triángulos (*Elementos* VI.2) se tiene $A\Theta = \Theta B$, ya que $AE = E\Delta$. Por tanto, la recta ΘZ pasa por la mitad de AB y, al ser paralela al diámetro del segmento ABΓ, es el diámetro del segmento AZB, luego (Proposición 18) Z es el vértice.
- ¹³¹Acabamos de ver que $B\Delta = (4/3)EZvB\Delta = 2E\Theta$. Por tanto, $E\Theta = (2/3)EZ = (2/3)(E\Theta + \Theta Z)$, de donde resulta
- 132 Los triángulos A Θ Z, AE Θ tienen la misma altura y sus bases son Θ Z y E Θ = 2 Θ Z, luego (*Elementos* VI.1) el triángulo AEO es doble del AOZ. Los triángulos ZOB y OBE tienen la misma altura y sus bases son Θ Z y $E\Theta$ = 2Θ Z, luego (*Elementos* VI.1) el triángulo Θ BE es doble del Z Θ B. Ahora bien, el triángulo AEB se compone de la suma de los triángulos AE Θ y Θ BE; y el triángulo ZBA se compone de la suma de los triángulos A@Z y Z@B. Por tanto, el triángulo AEB es el doble del triángulo ZBA.
- 133 De Elementos VI.1 se tiene triángulo AB $\Gamma=2$ triángulo AB $\Delta=4$ triángulo AEB. Por tanto, a partir de la nota anterior resulta triángulo $AB\Gamma = 8$ triángulo AZB. De la misma forma se comprueba que triángulo $AB\Gamma = 8$ triángulo $AB\Gamma = 8$ triángulo AZB. Striángulo BHF.
- 134 Como apunta la demostración, la expresión «en una serie de razón cuatro» debe entenderse «en progresión geométrica decreciente de razón 1/4»

La herencia de Arquímedes

Cuadratura de la parábola

Tanto estos precursores, como el propio Arquímedes (-287 -212) en su famosa cuadratura de la parábola, no utilizan el método que hoy llamaríamos de la integral, sino el método de exhaución, que consiste en descomponer la figura en una serie convergente de trozos y la suma de la serie de medidas de ellos da la extensión de la figura total. Así p. ej. la simple



inspección de la figura indica claramente cómo llega Arquímedes a la serie geométrica:

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots = \frac{4}{3}$$


Esta es la primera serie convergente que aparece en la Historia, y Arquímedes logró calcular su suma tomando como unidad el área del triángulo A B C.

Su mérito sobresaliente es el de haber establecido además los fundamentos del Cálculo integral, con otro método de cuadratura de la parábola que no figura en la gran Historia de Cantor y que equivale en esencia al cálculo de la integral de x².

Julio Rey Pastor: **Evolución del cálculo infinitesimal** Apéndice a su libro *Cálculo Infinitesimal*, BsAs, 1921 (3ª ed. 1938)

La herencia de Arquímedes Sobre la espiral / área

E = (1/3) C




Argumentos infinitesimales

«Integración en polares»



A. J. Durán.

Historia, con personajes, de los conceptos del cálculo Alianza, Madrid, 1994 Otro ejemplo del método de las sumas integrales es la determinación del área de la primera espira de la espiral de Arquímedes: $\rho=\varphi$. La espiral se introduce cinemáticamente como trayectoria de un punto, sometido a dos



movimientos uniformes: un giro del rayo alrededor del punto y un movimiento del punto a lo largo del rayo desde el centro (fig. 18). Para la determinación del área de la primera espira, se divide la circunferencia (r = a)

en *n* partes. A continuación se construyen dos sucesiones de sectores circulares inscritos y circunscritos, cuyos radios son $\frac{a}{n}$, $\frac{2a}{n}$, $\frac{3a}{n}$, ..., $\frac{na}{n} = a$.

Sus áreas: $S_k = \frac{\pi r_k^2}{n}$, k = 1, 2, ..., n. Estas sucesiones forman figuras inscritas y circunscritas, el área de las cuales es respectivamente mayor y menor que el área de la espira de la espiral:

$$\frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{ka}{n}\right)^2 < S < \frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{ka}{n}\right)^2, \quad 6$$

$$\frac{\pi a^2}{n^3} \sum_{k=1}^{n-1} k^2 < S < \frac{\pi a^2}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2.$$

Sobre la base de las estimaciones citadas en el ejemplo anterior,

$$V_{\rm ins} < \frac{\pi a^2}{n^3} \cdot \frac{n^3}{3} = \frac{\pi a^2}{3}$$
, y además $V_{\rm cir} > \frac{\pi a^2}{3}$.

Pero la diferencia entre las sumas que aproximan puede ser hecha tan pequeña como se quiera. Por consiguiente $S=\frac{\pi a^2}{3}$.


La herencia de Arquímedes

Sobre la espiral / tangente

Trazado de la tangente en P

K. Ríbnikov *Historia de las matemáticas* Ed. Mir, Moscú, 1987





α

Determinar T [t = OT] en la perpendicular del radio vector. $t = r^2$

 $r=\theta$

Si ε es muy pequeño [infinitesimal] se puede tomar PFR ~ PTO, luego $r\varepsilon$: ε :: t : r

OT es la rectificación del arco circular dado por las coordenadas (polares) de P Arquímedes triseca un ángulo con la espiral



SEGUIDORES EN EL SIGLO XVII: EXPERIMENTADORES



Cavalieri, Mengoli



Roberval



Fermat, Pascal



Huygens



Wallis, Barrow

Nuevas matemáticas en la Europa del siglo XVII

Comienzan los estudios cinemáticos

Aparecen los logaritmos [números decimales]

Auge de algoritmos infinitos


Termina el proceso de «algebrización»

Geometría analítica

Sociedades nacionales y revistas

Se acumula experiencia con los métodos de Arquímedes para áreas y tangentes

> Desfases entre creación y publicación Vías de comunicación insuficientes Con o sin geometría analítica



Alianza, 1992

Elenco de experimentadores con los infinitésimos

December

1506 1650


	Descartes	1596–1650
Continentales	Cavalieri Fermat	1598–1647 1601–1665
Italia: Cavalieri, Torricelli, Mengoli	Roberval Torricelli	1602–1675 1608–1647
Francia: Fermat, Roberval, Pascal	Wallis Pascal	1616–1703 1623–1651
Países Bajos: Huygens	Mengoli Huygens	1626–1686 1629–1695
Insulares	Barrow Gregory	1630–1677 1638–1676
Wallis, Barrow, Gregory	Newton	1643–1727
	Leibniz	1646–1716

Indivisibles de Cavalieri

CAVALIERI 1635, *Geometría de los indivisibles*. Obtiene que el área bajo las parábolas mediante su método original de «suma de líneas».

ROBERVAL, c. 1637, que el área bajo un arco de la cicloide es igual a 3 veces el área del círculo generador.

Obtuvo la tangente por método cinemático de composición de velocidades.



MENGOLI fue discípulo de Cavalieri. Trabajó con indivisibles y con otros métodos propios, logrando entre 1650 y 1672 importantes resultados sobre sumación de series y cuadraturas, incluida la del círculo. Estudia convergencia de series. Comparte resultados con otros autores. Publicó en libros que no ejercieron influencia,

Especialista sobre Mengoli es María Rosa Massa Esteve

Nicolaus MERCATOR (1620-1687), publicó Logarithmitechnia en 1668.

Área bajo parábolas


FERMAT 1636, Carta a Roberval. encaja el área bajo la parábola $y=x^k$ entre sumas de rectángulos por defecto y por exceso sobre una partición de [0,b] en n partes iguales y de allí obtiene el área bajo la parábola.

$$\frac{b^{k+1}}{n^{k+1}} \left(1^k + 2^k + \dots + n^k \right) < \frac{b^{k+1}}{k+1} < \frac{b^{k+1}}{n^{k+1}} \left(1^k + 2^k + \dots + (n+1)^k \right).$$

También para hipérbolas con exponente distinto de -1. Partición en progresión geométrica

WALLIS 1656, *Arithmetica Infinitorum*. Toma la misma partición que Fermat y calcula la razón del área bajo la parábola a la del rectángulo de base b y altura b^k .


$$\frac{par}{rec} = \frac{0^k + 1^k + 2^h + \dots + n^k}{n^k + n^k + n^h + \dots + n^k} = \frac{1}{k+1}$$



Otras áreas

PASCAL 1659.

Tratado de los senos de los cuadrantes circulares.



Calcula el área bajo la curva seno usando el «triángulo característico» considerando que «Para pequeños triángulos se puede sustituir el arco de curva por la tangente».

Obtiene:


«La suma de los senos de cualquier arco del cuadrante es igual a la porción de la base entre los senos extremos, multiplicada por el radio.»

$$\int_{\alpha}^{\beta} r \sin \theta \, d(r\theta) = r(r \cos \theta - r \cos \beta), \quad [\alpha < \beta]$$

FERMAT, 1638 Trazado de tangentes

Se expresaba en el lenguaje de Vieta





lemejanza:
$$\frac{AI}{BC} = \frac{FI}{FC}$$

li CI pequero, es "odecuedo"

 $\frac{FI}{BC} = \frac{EI}{FC}$
 $\frac{f(x+e)}{f(x)} = \frac{t+e}{t}$
 $\frac{f(x+e)}{f(x+e)} = (t+e)f(x)$

$$e_j$$
: $j=x^2$: $t(x+e)^2=(t+e)x^2$
 $2t \times t = x^2$
 $2t \times = x^2$
 $t=\frac{x}{2}$

Pla / Viader / Paradís

Fermat no inventó el cálculo

Side Bar 12.2 Did Fermat Invent the Calculus?


By the mid-1640s Fermat had determined the area under any curve of the form $y = x^k$ (except, of course, $y = x^{-1}$, a curve for which Fermat realized his method did not apply) and also had been able to construct the tangent to such a curve. Since he had solved the two major problems of the calculus, at least in these significant special cases, why should he not be considered as the inventor of the calculus? The answer must be that Fermat did not realize the inverse relationship between the two problems and therefore could not apply results on tangents to calculate results on areas. A student today, seeing that the derivative of $y = x^k$ was $y' = kx^{k-1}$ and also that the area under $y = x^k$ from 0 to x was $\frac{x^{k+1}}{k+1}$ would probably immediately recognize this inverse property. Fermat did not, because he was not asking the questions which would lead him to it. For Fermat, construction of a tangent meant exactly that: find the length of the subtangent

and then draw the line from the point on the curve to the appropriate point on the axis. Thus, he did not generally consider the slope of the tangent line, what we call the derivative. In dealing with $y = x^k$, he would find that the subtangent t equaled x/k rather than that the slope of the tangent equaled kx^{k-1} . Similarly, to find an area under a curve meant for Fermat to find a suitable rectangle equal in area to the given curvilinear region. In other words, the area under $y = x^k$ from 0 to x_0 equaled the area of the rectangle whose width was x_0 and whose height was $\frac{1}{k+1}y_0$. He never considered the area from a fixed coordinate to a variable one as determining a function, expressible as a new curve. Thus, although Fermat was able to solve the two basic problems of the calculus in many instances, he did not ask the "right" questions. It was others who were able to see what Fermat missed.

V. J. Katz: *A History ot Mathematics. An introduction* Harper Collins College Publishers, New York, 1993

Barrow tampoco

Es el que más cerca estuvo en 1670. *Lectiones geometricae*.




Given that Barrow knew the algebraic procedures for calculating tangents and areas and was also aware of the fundamental theorem, should he be considered one of the inventors of the calculus? The answer must be no. Barrow presented all of his work in a classic geometric form. It does not appear that he was aware of the fundamental nature of the two theorems presented in the text. Barrow does not mention that they are particularly important. They are presented as two among many geometrical results dealing with tangents and areas. And Barrow never uses them to calculate areas. Perhaps if Newton had not come along, Barrow would have seen the uses to which these theorems could be put. But because he realized that Newton's abilities outshone his own, and because he was more concerned with pursuing theological interests, Barrow abandoned the study of mathematics to his younger colleague and left to him the invention of the calculus. [Katz]

GREGORY 1668, Geometriae pars universalis.

«Si hubiera vivido podría haberse equiparado con Newton y Leibniz como un inventor del cálculo.»

D. J. Struik, A concise history of mathematics, Dover, 1987



Ш

INVENTORES

NEWTON Y LEIBNIZ








NEWTON Y LEIBNIZ



Side Bar 12.4 Newton, Leibniz, and the Invention of the Calculus

Newton and Leibniz are considered the inventors of the calculus, rather than Fermat or Barrow or someone else, because they accomplished four tasks. They each developed general concepts, for Newton the fluxion and fluent, for Leibniz the differential and integral, which were related to the two basic problems of calculus, extrema and area. They developed notations and algorithms which allowed the easy use of these concepts. They understood and applied the inverse relationship of their two concepts. Finally, they used these two concepts in the solution of many difficult and previously unsolvable problems. What neither did, however, was establish their methods with the rigor of classical Greek geometry, because both in fact used infinitesimal quantities.



Isaac NEWTON (1643–1727)



Ilustración en H. Wussing: Lecciones de historia de las matemáticas. Siglo XXI, 1998

Obra de 1671 sin publicar hasta 1736.

La toma Katz toma como guión para explicar el cálculo de Newton:

Series de potencias

Fluxiones y aplicaciones

Cálculo de áreas

Tampoco publicó en su momento una obra en 1966 y otra en 1969, De analysis per aequationes numero terminorum infinitas Publicada en 1711

Estas obras recogen investigaciones realizados durante los años 60.

METHOD of FLUXIONS

AND

INFINITE SERIES;

WITH ITS

Application to the Geometry of CURVE-LINES.

By the Inventor

Sir ISAAC NEWTON, K.

Late Prefident of the Royal Society.

Translated from the AUTHOR'S LATIN ORIGINAL net yet made publich.

To which is felician'd,

A PERPETUAL COMMENT upon the whole Work,

Confishing of

ANNOTATIONS, ILLUSTRATIONS, and SUPPLEMENTS.


In onler to make the Treatife

A compleat Institution for the use of LEARNERS.


By JOHN COLSON, M. A. and F. R.S. Mafter of Sir Joseph Williamson's free Mathematical-School at Rackgler.

Printed by HENRY WOODFALL;

And Sold by Jong Nourse, at the Lamb without Temple-Bar.
M.DCC.XXXVI.



Publicado por la RSME y la SAEM «Thales», en colaboración con el ROA



Edición facsimilar, crítica y traducida del *Analysis...* de Newton, a cargo de A. J. Durán y F. J. Pérez Fernández (Dos volúmenes en estuche. Edición numerada).

I: Reproducción facsimilar de Analysis...

II: Traducción de J. L. Arántegui, Notas y comentarios a cargo de A. J. Durán Estudios: J. M. Sánchez Ron, sobre Newton

A. J. Durán, sobre la obra

J. Echeverría, sobre la controversia

NEWTON y las series de potencias

Extensión de operaciones aritméticas

Las operaciones con números que producen expresiones decimales infinitas se repiten por analogía con los polinomios y dan series de potencias

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^4 + x^4 - x^5 + \dots \qquad \sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{16} - \frac{5x^8}{128} + \frac{7x^{10}}{256} - \dots$$

$$y^3 + a^2y + axy - 2a^3 - x^3 = 0$$
 $y = a - \frac{x}{a} + \frac{x^2}{64a} + \frac{131x^3}{512a^2} + \frac{509x^4}{1638a^4} + \cdots$

Serie binomial: La obtiene inspirado en Wallis.

$$(1+x)^r = \sum_{n=0}^{\infty} {r \choose n} x^n$$
, con ${r \choose n} = \frac{r(r-1)\cdots(r-n+1)}{n!}$

$$(1-x^2)^{1/2} = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{16}x^6 - \frac{1}{128}x^8 - \dots$$

Serie del logaritmo: Mercator la publicó en 1668. La obtuvieron Mengoli y Gregory.

Vinculada al área bajo la hipérbola equilátera (St. Vicent, Sarasa)

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

Series exponencial y trigonométricas: A partir de las anteriores con las fluxiones.

NEWTON y las fluxiones

Cada cantidad variable x o fluente varía o fluye con el tiempo, con una velocidad \dot{x} o fluxión.

Tras un intervalo de tiempo o (que resultará «evanescente») la cantidad variable x tendrá en el instante t+o el valor (o posición) $x+\dot{x}o$, con un incremento $\dot{x}o$ llamado momento (que también resultará «evanescente»).

El tiempo t verifica $\dot{t} = 1$ (o es el momento de t).

Newton se plantea dos problemas inversos con dos fluentes que fluyen ligadas por una relación o ecuación:

- 1. Dada una relación entre fluentes encontrar la relación entre sus fluxiones.
- 2. Dada una relación entre fluxiones encontrar la relación entre sus fluentes.

Lenguaje actual: el problema 1 es derivar y el 2 es integrar

Problema 1

Para resolver el Problema 1 Newton elabora un álgebra para o:

- 1. Se puede dividir por o.
- 2. Cuando *oo* opera junto a *o* puede despreciarse.
- 3. Cuando solo queda o puede despreciarse.

Ejemplo $y = x^3$: $y + \dot{y}o = (x + \dot{x}o)^3 = x^3 + 3x^2\dot{x}o + 3x\dot{x}^2oo + \dot{x}^3ooo$. Simplificando: $\dot{y}o = 3x^2\dot{x}o + 3x\dot{x}^2oo + \dot{x}^3ooo$. Aplicando álgebra de o:


- 1. Se dividir por $o: \dot{y} = 3x^2\dot{x} + 3x\dot{x}^2o + \dot{x}^3oo.$
- 2. Cuando *oo* opera junto a *o* se desprecia: $\dot{y} = 3x^2\dot{x} + 3x\dot{x}^2o$.
- 3. Cuando solo que da o se desprecia: $\dot{y} = 3x^2\dot{x}$.

En general: Con $y = x^n$ da $\dot{y} = nx^{n-1}\dot{x}$. El ejemplo de Newton:

$$x^{3} - ax^{2} + axy - y^{3} = 0,$$
 $(3x^{2} - 2ax + ay)\dot{x} + (ax - 3y^{2})\dot{y} = 0.$

Con las reglas de la suma y el producto el cálculo de fluxiones se extiende a polinomios y series de potencias

Tangente y Curvatura



Según la costumbre de la época, la tangente a y=f(x) se determina calculando el segmento subtangente t.

El coeficiente angular de la tangente es $u = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$.

Por semejanza con el triángulo infinitesimal se verifica

$$\frac{y}{\mathbf{t}} = \frac{\dot{y}o}{\dot{x}o} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = u, \qquad \mathbf{t} = \frac{y}{u}$$

Para Newton, el radio de curvatura ρ es el radio de la menor circunferencia tangente a la cura, lo calcula (como Huygens y Gregory) por el método de punto de intersección de la normal con otra «muy próxima». El resultado es

$$\rho = \frac{(1+u^2)^{\frac{3}{2}}}{\dot{u}}$$

NEWTON

Método de fluxiones y series infinitas (1671/1736)

Con las fluxiones resuelve cuestiones de geometría de curvas::

Inscribir el mayor rectángulo en un segmento de curva dado.

Normal a una curva desde un punto.

Recta que pasa por un punto y corta a dos curvas según un segmento máximo o mínimo.

Recta que corta a una curva bajo un ángulo máximo.

Determinar vértices y anchuras máxima o mínima de curvas.

Puntos de curvas en los que la curvatura es máxima o mínima.


Dada una elipse, ángulo mínimo en que la ordenada corta a un diámetro.

NEWTON y las áreas

Del Análisi..., p. 55

1. Demostración de la cuadratura de curvas simples en la regla primera

Preparación para demostrar la regla primera



Sean pues AB = x, base de una curva cualquiera $AD\delta$, la aplicada en perpendicular BD = y y el área ABD = z como antes. Sean así mismo $B\beta = o$, ⁸⁹ BK = v, y el rectángulo $B\beta HK$ (ov), igual en espacio a $B\beta\delta D$.

Luego $A\beta = x + o$, y $A\delta\beta = z + ov$. Esto por delante, busco y a partir de la relación entre x y z asumida arbitrariamente del modo que verás

en lo que sigue.

Se asume a discreción que $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} = z$, ó $\frac{4}{9}x^3 = zz$. Substituidos entonces x por $x + o(A\beta)$ y z por $z + ov(A\delta\beta)$, aparecerá (por la naturaleza de la curva)

Teorema fundamental del cálculo: El area ABD, denotada z, depende de la abscisa x y su fluxión respecto a ella es la orenada y, es decir:

$$\frac{\dot{z}}{\dot{x}} = y.$$

Después de avanzar la prueba mediante un ejemplo, lo demuestra mediante fluxiones para $z = \frac{an}{m+n} x^{\frac{m+n}{n}}$.

NEWTON y las áreas


De esta prueba siguen las tres reglas para la cuadratura de las curvas mediante series infinitas:

- 1. Para $y = ax^{\frac{m}{n}}$ el área ABD es $z = \frac{an}{m+n}x^{\frac{m+n}{n}}$.
- 2. La cuadratura es lineal (cuadrar funciones polinómicas).
- 3. También para series de potencias (incluso exponentes fraccionarios).

Si $\dot{x} = 1$ esto significa que $\dot{z} = y$ y para obtener z Newton procede así:

- 1. Expresa y en serie de potencias
- 2. integra término a término

Con estas reglas llega a dar una tabla de cuadraturas (primitivas).



Desarrollos trigonométricos. En la figura se representa un cuadrante de círculo de radio unidad, y es el arco del seno x, el área entre ambos es z, de manera que $\frac{\dot{z}}{\dot{x}} = \sqrt{1-x^2}$; con $\dot{x} = 1$ y queda $\dot{z} = \sqrt{1-x^2}$, que tiene un desarrollo en serie conocido; «integrando término a término» se obtiene z =. Pero la geometría da las relaciones

$$z = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2},$$
 $y = 2z - \sqrt{1-x^2},$

de la última sigue el desarrollo del arco del seno:

$$y = [\arcsin x] = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}y^5 + \frac{5}{112}x^7 + \cdots$$

Newton invierte esta formula para obtener (por primera vez)

$$x = \operatorname{sen} y = y - \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{120}y^5 - \frac{1}{5040}y^7 + \cdots$$

y de esta deduce la serie del coseno calculando $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y}$.




Gottfried W. LEIBNIZ (1646–1716)

LEIBNIZ aprendió matemáticas en París con Huygens en los años 70 y pronto empezó a publicar breves extractos de su cálculo en Acta Eroditorum

Tras la actusación de plagio a Newton, escribió en 1714

Historia et origo calculi differentialis







Mary Sol de Mora Charles

LEIBNIZ:


la cuadratura aritmética







Teorema de tromuntación



$$\int y dx = \frac{1}{2} \left(ab + \int 2 dx \right)$$

$$\frac{ds}{dx} = \frac{2}{R}$$
of the same of the course of the order of the course of the cou

G. Le circumferencie
$$y^2 = 2x - x^2$$
 de $\frac{\pi}{4} = \int_{1}^{\infty} dx = \frac{1}{2} (1 + \int_{1}^{2} dx)$, riends $z^2 = \frac{x}{2-x}$ " $x = \frac{2z^2}{1+z^2} = 2z^2 (1-z^2+z^4-z^6+\cdots)$

Pero
$$\int z dx = 1 - \int x dz = 1 - \int \frac{2z^2}{1+z^2} dz$$
, que u colcula interpando termino a tirmino, luepo
$$\frac{T}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + --$$

Newton
$$\pi = \frac{3\sqrt{3}}{4} + 24\left(\frac{2}{3\cdot 2^3} - \frac{1}{5\cdot 2^5} - \frac{1}{28\cdot 2^7} - \frac{1}{72\cdot 2^9} - \frac{5}{704\cdot 2^{11}} - \cdots\right)$$

LEIBNIZ

Lenguaje simbólico

Característica universal

Inspiración combinatoria

(EIBNIZ

La base combinatoria del terreno fundamental

Ses une raviolee y a la que donns une mcerión finite de valores y obtenemes un diferencias:

ao
$$a_1$$
 a_2 a_3 - - a_n a_n

Se tiene
$$a_n - a_0 = \sum_i \Delta_i$$

Si la nucerión de volorer re hace infinite:

pero rique raliends la regla peneral $y = \int dy$

Tomando Ai = a0+--+ai re puede repetir una muerin de mueno rabres y un diferencias

lo que riprifica, perando a infinitos valores |y=d(y)|

Las reglas de **LEIBNIZ** para diferenciar también tienen inspiración combinatoria


$$d(xy) = y dx + x dy,$$
 $d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{y dx - x dy}{y^2}$

$$z_n = \left(\sum_{j=1}^n x_j\right) \left(\sum_{j=1}^n y_j\right)$$


$$z_{n+1} - z_n = x_{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} y_j + y_{n+1} \sum_{j=1}^{n} x_j$$

LEIBNIZ

Solución de una ecuación diferencial lineal



LEIBNIZ



Triangulo infiniterimal (Pascal)
$$ds: dx: dy = \tau: y: t = n: v: y$$

$$t = y \frac{dx}{dy}, v = y \frac{dy}{dx}$$

Problema de Debeaume (a Descarter, 1639; nin revolver) Hallar una curve y=f(x) an substangente constante t=a dada.

leibniz remelie la ecucación difuencial a dy = dx con un análim combinatorio:

Si las difuencias de un contantes

 $0=\times_0$ d \times_1 d \times_2 d \times_3 d \times_4 d \times_4 entouces $d=\frac{\times}{N}$ $\int_1^{\infty} \ln x_i \int_1^{\infty} \ln x_i \int$

Entouces les obras diferencias rerain $dy = \frac{d}{a}y$, an que darán valores y en progresión geométrica

$$1 = j_0$$
 j_1 j_2 j_3 ... j_{n-1} $j_n = j$ $j_i = (1 + \frac{d}{a})^i j_0$. $i = 0, 1, ... n$

Por fonts: $y = (1 + \frac{x}{a^n})^n$ (relación logoríturico)

(Nota: hi now, y = exa, x = a logy)

Últimos comentarios

Polémica sobre prioridad

DAUBEN, J.W.: Matemáticas: la perspectiva de un historiador, LLULL, 16 (1993) 23-41.

Formulación sintética insular

Desarrollo analítico continental

La metafísica del cálculo

La Sociedad Analítica

FIN

Muchas gracias a los que me invitasteis a venir y a los que me habeis escuchado